ACTUALIDAD EN LA ATENCIÓN AL TABAQUISMO



Dra. Claudia Domenica Lozano Vega Medico Especialista en Medicina Integrada





Tabaquismo: Enfermedad Mortal



Aspectos epidemiológicos.






 Estructura de la Intervención Breve Motivacional para fumadores.

 Tratamientos disponibles para dejar de fumar.



Actualmente se ha demostrado que el consumo de cigarrillos <u>no es un hábito</u>, sino una <u>ADICCIÓN</u>, que la DROGA responsable es la <u>NICOTINA</u>



El tabaquismo constituye la PRINCIPAL CAUSA DE MUERTE EVITABLE EN LOS PAISES DESARROLLADOS.

MORTAL en todas sus presentaciones



Magnitud del problema

165 mexicanos
mueren
diariamente
por enfermedades
asociadas al
consumo de tabaco

MÉXICO


Fallecen más de 60,000 personas fumadoras al año

80% de los fumadores Mexicanos se convirtieron en adictos antes de cumplir 18 años.

Proporción de fumadores dependientes



Prevalencia de Fumadores actuales, diferencias por genero



De ellos el 6.8% fuma seis o más cigarros diarios

El Adulto Joven


- El 27% de adultos (entre 18 y 65 años) fuman.
- Entre los fumadores 32.6% son adultos jóvenes.
- 72% fuman a diario entre 1 y 5 cigarros.
- 20% fuman de 6 a 10 cigarros
- 5% de fuman de 11 a 20 cigarros
- 3% más de 20 cigarros diarios



Tabaquismo Pasivo







TABACO: PRODUCTO "ÚNICO" EN EL MERCADO









MARCA

El humo de tabaco los ahoga y enferma



MARCA

Tú también puedes tener un



Cada cigarrillo que fumas aumenta las probabilidades para ti y para los que te rodean

MINISTERIO DE SALUD-CHILE

O Ministério da Saúde adverte:

FUMAR CAUSA CÂNCER DE PULMÃO.



O Ministério da Saúde adverte:

FUMAR CAUSA CÂNCER DE LARINGE.




O Ministério da Saúde adverte:

CAUSADA PELO CONSUMO DO TABACO.



O Ministério da Saúde adverte:

ELE É UMA VÍTIMA DO TABACO. FUMAR CAUSA DOENÇA VASCULAR QUE PODE LEVAR A AMPUTAÇÃO.



O Ministério da Saúde adverte:

FUMAR CAUSA ABORTO ESPONTÂNEO.



O Ministério da Saúde adverte:

PROVOCA PARTOS FREMATUROS E O NASCIMENTO DE CRIANÇAS COM PESO ABAIXO DO NORMAL.





SI FUMAS DURANTE EL EMBARAZO PUEDES SUFRIR UN ABORTO

El humo del tabaco disminuye la cantidad de oxígeno y alimento que recibe tu bebé.



CONTIENE TALIO

Veneno utilizado en raticidas e insecticidas,

Deja de fumar, te conviene 01800 966 3863 El riesgo de enfermedad coronaria se reduce en un 50% después de un año de haber dejado de fumar

Dejar de fumar reduce el riesgo de enfermedades mortales de corazón y pulmón



Fumar obstruye las arterias y provoca cardiopatías y accidentes cerebrovas culares






Fumar puede reducir el flujo sanguíneo y provoca impotencia



Proteja a los niños: no les haga respirar el humo del tabaco





Fumar provoca el envejecimiento de la piel







Tú puedes conseguir nosotros podemos ayudarte

Su médico o su farmacéutico pueden ayudarle a dejar de fumar

Consecuencias nocivas a la salud




Grafica de egresos hospitalarios por enfermedades relacionadas con el tabaquismo de población 20 años y mas



Grafica de egresos hospitalarios por enfermedades relacionadas con el tabaquismo de población 20 años y mas

























Estructura de la Intervención breve motivacional para fumadores

- Sesión de admisión
- Sesión de evaluación
- Tomar la decision de dejar de fumar
- Identificación de situaciones relacionadas con fumar
- Planes de acción para dejar de fumar
- Mantenimiento sin fumar
- Sesiones de seguimiento



Tratamientos para dejar de fumar

1) Folletos de autoayuda y programas breves

2) Terapias farmacológicas nicotínicas

3) Terapias farmacológicas no nicotínicas

4) Programas Psicologicos 5) Terapia de combinación

Drogas de primera linea













B) Tratamiento no nicotinico

Bupropion



Drogas de segunda linea

Nortriptilina



Clonidina



Nuevas drogas


• 1.- Methoxsalen

• 2.- Rimonabant

• 3.- Vareniclina

4.- Vacunas

Apoyo Profesional + Farmacológico





Conclusiones

• Impacto: Una de cada 9 muertes en nuestro país es a consecuencia del tabaquismo

La mayoría de fumadores actuales iniciaron su consumo entre los 15 y 17 años

Exposición al tabaco: 8 de cada 10 mexicanos lo están usando de manera directa o indirecta







- Fiore Tobacco dependence and nicotina patchclinical guide por effective use. JAMA 268:2687;192
- Jorenby DE; Varenicline Phase 3 Study Group. Efficacy of varenicline, an alpha4beta2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs placebo or sustained- release bupropion for smoking cessation
- Guía Tomar la decisión de dejar de fumar
- Guía identificación de mis situaciones relacionadas con fumar
- Planes de accion para dejar de fumar

Gracias...

